


**HUBUNGAN *VULVA HYGIENE* DENGAN KEJADIAN INFEKSI  
LUKA PERINEUM PADA IBU NIFAS DI WILAYAH  
POSKESDES KELURAHAN BANGUN JAYA  
KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN  
MUSI RAWAS**

**SKIRPSI**




**OLEH:**

**FETTY NOVASANDAY**  
**NPM : 21270122P**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
TAHUN 2023**

**HUBUNGAN *VULVA HYGIENE* DENGAN KEJADIAN INFEKSI  
LUKA PERINEUM PADA IBU NIFAS DI WILAYAH  
POSKESDES KELURAHAN BANGUN JAYA  
KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN  
MUSI RAWAS**

**SKIRPSI**



**OLEH:**

**FETTY NOVASANDAY**  
**NPM : 21270122P**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Kebidanan pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
TAHUN 2023**

**ABSTRAK**  
**HUBUNGAN *VULVA HYGIENE* DENGAN KEJADIAN INFEKSI**  
**LUKA PERINEUM PADA IBU NIFAS DI WILAYAH**  
**POSKESDES KELURAHAN BANGUN JAYA**  
**KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN**  
**MUSI RAWAS**

**Oleh :**  
**Fetty Novasanday1)**  
**Yatri Hilinti 2)**  
**Syami Yulianti 2)**

Upaya menghindari infeksi perineum yaitu dengan dilakukannya perawatan vulva yang disebut vulva hygiene. Munculnya infeksi perineum dapat merambat pada saluran kandung kemih ataupun pada jalan lahir, infeksi tidak hanya menghambat proses penyembuhan luka tetapi dapat juga menyebabkan kerusakan sel penunjang, sehingga akan menambah ukuran dari luka itu sendiri baik panjang maupun kedalaman dari luka. Tujuan Penelitian ini yaitu diketahuinya hubungan vulva hygiene dengan kejadian infeksi luka perineum pada ibu nifas di Wilayah Poskesdes Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *analitik* dengan rancangan *cross sectional study*. Pengukuran variabel dilakukan pada suatu saat artinya subjek diobservasi dan dilakukan pengukuran pada saat yang sama. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 35 orang. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi infeksi perineum dan kuesioner *vulva hygiene*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari sebagian responden 27 ibu nifas (77.1%) yang melakukan *vulva hygiene* yang tidak infeksi. Hasil dari perhitungan uji *chi square* diperoleh nilai *fisher exact test* sebesar  $0.000 < \alpha (0,05)$  sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *vulva hygiene* dengan kejadian luka perineum pada ibu nifas di Poskesdes Bangun Jaya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada hubungan vulva hygiene dengan kejadian luka perineum pada ibu nifas di Poskesdes Bangun Jaya. Peneliti menyarankan kepada pihak Poskesdes Bangun Jaya agar dapat meningkatkan pemberian KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) tentang *vulva hygiene* untuk mempercepat penyembuhan luka perineum.

**Kata kunci :** *Vulva Hygiene*, Infeksi Luka Perineum, Nifas.

**Keterangan :**

- 1: Calon Sarjana Kebidanan
- 2: Pembimbing

## **ABSTRACT**

**A CORRELATION BETWEEN VULVA HYGIENE AND THE INCIDENCE OF  
PERINEAL WOUND INFECTION IN POSTPARTUM MOTHERS IN  
POSKESDES AREA OF BANGUN JAYA VILLAGE  
OF BTS ULU SUBDISTRICT OF  
MUSI RAWAS REGENCY**

*by :*

**Fetty Novasanday<sup>1)</sup>**

**Yatri Hilinti <sup>2)</sup>**

**Syami Yulianti <sup>2)</sup>**

*Efforts to avoid perineal infection are carried out by taking care of the vulva called vulva hygiene. The appearance of perineal infection can spread to the bladder channel or the birth canal, infection not only inhibits the wound healing process but can also cause damage to supporting cells, so that it will increase the size of the wound itself both in length and depth of the wound. The purpose of this study was to determine the relationship between vulvar hygiene and the incidence of perineal wound infection in postpartum women in the Poskesdes Region of Bangun Jaya Village, BTS Ulu District, Musi Rawas Regency. This study used analytic research with a cross sectional study design. Measurement of variables is carried out at one time, meaning that the subject is observed and measured at the same time. The number of samples in this study were 35 people. The instruments used in this study were perineal infection observation sheet and vulva hygiene questionnaire. The results showed that more than half of the respondents 27 postpartum women (77.1%) who performed vulvar hygiene were not infected. The results of the chi square test calculation obtained a fisher exact test value of  $0.000 < \alpha (0.05)$  so it can be concluded that there is a significant relationship between vulvar hygiene and the incidence of perineal wounds in postpartum women in Bangun Jaya Poskesdes. The conclusion of this study is that there is a relationship between vulvar hygiene and the incidence of perineal wounds in postpartum women at Poskesdes Bangun Jaya. The researcher suggested that the Poskesdes Bangun Jaya should increase the provision of IEC (communication, information and education) about vulvar hygiene to accelerate the healing of perineal wounds.*

**Keywords :** *Vulva Hygiene, Perineal Wound Infection, Postpartum.*

**Information :**

- 1. Midwifery Bachelor Candidate*
- 2. Supervisors*