

**HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN  
PEMBATASAN CAIRAN PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK  
YANG MENJALANI TERAPI HEMODIALISA DI RSUD ARGA  
MAKMUR  
TAHUN 2019**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**LISCHA ENJELINA**

**NPM : 172426133 SPA**

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S-1)  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
TAHUN 2019**

## **ABSTRAK**

### **HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN PEMBATASAN CAIRAN PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI TERAPI HEMODIALISADI RSUD ARGA MAKMUR TAHUN 2019**

**Oleh :**  
**Lischa Enjelina**  
**Wulandari, SKM., M. Kes**  
**Milono, S.Sos.,SKM. MM., M. Kes**

Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) secara global mengatakan lebih dari 340 juta orang mengalami gagal ginjal kronik. Sekitar 1,5 juta orang harus menjalani hidup dengan bergantung dengan cuci darah (WHO, 2012). Prevelensi kejadian Gagal Ginjal kronik di Amerika Serikat pada tahun 2014 lebih dari 634.000 kasus Gagal Ginjal kronik. Selain itu sekitar 6 juta hingga 20 juta individu di Amerika diperkirakan mengalami penyakit ginjal kronik tahap awal (*World Kidney Disease*, 2014). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan pembatasan cairan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi Hemodialisa di Rumah Sakit Umum daerah Arga Makmur.

Metode yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dengan rancangan *cross sectional*. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuisioner dan lembar observasi pada 34 responden di Ruang Hemodialisa Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur.

Hasil analisis uji univariat menunjukkan bahwa responden memiliki dukungan keluarga yang baik yaitu sebanyak 23 orang (67,6%) dan responden dengan Kepatuhan Pembatasan Cairan Patuh yaitu sebanyak 24 orang (70,6%). Hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan pembatasan cairan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi Hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah Argamakmur dengan uji *chi-square* yang diambil dari *fisher's exact test* = 0,000.

Peneliti menyarankan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur untuk dapat memberikan pelayanan dan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya dukungan keluarga dengan kepatuhan pembatasan cairan pada pasien gagal ginjal kronik

Kata Kunci :

Keterangan :

Dukungan Keluarga, Kepatuhan Pembatasan cairan, Gagal Ginjal kronik, Hemodialisa.

1 : Calon Sarjana Keperawatan

2 Pembimbing

## **ABSTRACT**

### **RELATIONSHIP OF FAMILY SUPPORT WITH LIMITATION OF LIQUID LIMITATION IN CHRONIC KIDNEY PATIENTS WHO RUN HEMODIALYZED THERAPY IN ARGA MAKMUR REGIONAL GENERAL HOSPITAL PROSPEROUS YEAR 2019**

**By:  
Lischa Enjelina  
Wulandari, SKM., M. Kes  
Milono, S.Sos, .SKM. MM ,. M. Kes**

The World Health Organization (WHO) globally says more than 340 million people have chronic kidney failure. About 1.5 million people have to live their lives dependent on dialysis (WHO, 2012). The prevalence of chronic kidney failure in the United States in 2014 was more than 634,000 cases of chronic kidney failure. In addition, around 6 million to 20 million individuals in America are estimated to have early stage chronic kidney disease (World Kidney Disease, 2014). The purpose of this study was to determine the relationship between family support and adherence to fluid restriction in chronic kidney failure patients undergoing Hemodialysis therapy at the Arga Makmur General Hospital.

The method used is a quantitative analysis method with cross sectional design. Data was collected by distributing questionnaires and observation sheets to 34 respondents in the Hemodialysis Room of the Arga Makmur Regional General Hospital.

The results of the univariate test analysis showed that the respondents had good family support as many as 23 people (67.6%) and respondents with Compliance with Obedient Limitation Compliance as many as 24 people (70.6%). The results of bivariate analysis showed that there was a relationship between family support and adherence to fluid restriction in chronic renal failure patients undergoing Hemodialysis therapy at the Argamakmur Regional General Hospital with a chi-square test taken from the fisher's exact test = 0,000.

Researchers suggest to the Arga Makmur Regional General Hospital to be able to provide services and provide counseling about the importance of family support by adhering to fluid restrictions in patients with chronic kidney failure undergoing hemodialysis therapy.

**Keywords :**

**Information :**

Family Support, Fluid Compliance Compliance, Chronic Kidney Failure, Hemodialysis.

1: Prospective Undergraduate Nursing

2: Mentor