

**ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL DENGAN PARTUS  
PREMATURUS IMMINENS (PPI) DI RS. DKT BENGKULU  
TAHUN 2019**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**



Oleh :  
**EFI YANTINI**  
**NPM :18240030P**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIII) RPL FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN (FIKES) UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
TAHUN 2019**

## **ABSTRAK**

### **ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL DENGAN PARTUS PREMATURUS IMMINENS (PPI) DI RS DKT BENGKULU TAHUN 2019**

**Oleh :**

**Efi Yantini<sup>1</sup>**

**Dra. Hj. Ice Rakizah Syafrie, M.Kes<sup>2</sup>**

**Ns. Tita Septi Handayani, S.Kep., MNS<sup>2</sup>**

Angka kematian perinatal yaitu kematian bayi mulai usia kehamilan 28 minggu sampai satu bulan pasca melahirkan yang tetap masih tinggi. Tingginya angka kematian perinatal ini didominasi oleh bayi-bayi prematur sebanyak 70%, dan kejadian partus prematur di dunia masih cukup tinggi berkisar antara 10-20%. Indonesia memiliki angka kejadian partus prematur sekitar 19 % dan merupakan penyebab utama kematian perinatal. Upaya yang dapat mencegah terjadinya partus prematur yaitu dengan mendidik dengan cara memberitahu ibu pengetahuan tentang PPI dan mengawasi ibu yang mempunyai faktor resiko serta bila ditemukan adanya perubahan serviks dan his pasien harus dirawat. Penatalaksanaan partus prematurus iminens harus dilakukan dengan sesegera mungkin dan sangat penting untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas ibu dan bayi yaitu dengan menghambat kontraksi otot uterus dengan menggunakan Terapi Tokolitik.

Laporan studi kasus ini dibuat untuk melaksanakan manajemen asuhan kebidanaan dan mendokumentasikan hasil asuhan kebidanaan pada ibu hamil dengan Partus Prematur Iminens sesuai teori manajemen kebidanaan.

Dalam penyusunan laporan studi kasus ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan data-data yang didapat. Dari pengakajian yang dilakukan didapatkan hasil ibu hamil usia kehamilan 30-31 minggu dengan keluhan mengeluarkan flek darah dari jalan lahir dan nyeri pada perut. Tindakan yang dilakukan berupa pasang infus dan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi tokolitik sehingga kehamilan dapat dipertahankan Partus prematurus iminens adalah adanya suatu ancaman pada kehamilan dimana akan timbul persalinan pada umur kehamilan yang belum aterm (20 sampai 37 minggu) atau berat badan lahir kurang dari 2500 gram. Untuk ibu hamil diharapkan mengetahui tanda bahaya pada kehamilan lanjut dan ketika ditemukan segera konsultasi dengan pelayanan kesehatan

**Kata Kunci :** Hamil, Partus prematurus imminens

**Keterangan :**

1. Calon Ahli Madya Kebidanaan
2. Pembimbing

## **ABSTRACT**

### **A MIDWIFERY CARE FOR PREGNANT MOTHERS WITH PARTUS PREMATURUS IMMINENS (PPI) IN DKT HOSPITAL OF BENGKULU IN 2019**

**By**  
**Efi Yantini<sup>1</sup>**  
**Ice Rakizah Syafrie<sup>2</sup>**  
**Tita Septi Handayani<sup>2</sup>**

*Perinatal mortality is infant mortality from 28 weeks to one month postpartum which remains high. The high perinatal mortality rate is dominated by premature babies by 70%, and the case of premature parturition in the world is still quite high ranging between 10-20%. Indonesia has a premature parturition rate of around 19% and is a leading cause of perinatal death. Efforts that can prevent the occurrence of premature parturition are to educate by informing mothers of knowledge about PPI and supervising mothers who have risk factors and when cervical changes are found and the patient must be treated. Management of premature parturition imminens should be done as soon as possible and it is very important to reduce maternal and infant mortality and morbidity by inhibiting uterine muscle contractions using Toxic Therapy.*

*This case study report was made to carry out a midwifery care management and document the results of midwifery care for pregnant women with Partus Prematurus Imminens according to midwifery management theory.*

*In compiling this case study report, it was using a descriptive method that was by disclosing facts in accordance with the data obtained. From the assessment conducted, it was found that pregnant women aged 30-31 weeks gestational with complaints of removing blood spots from the birth canal and abdominal pain. Actions taken was using infusion pairs and doing collaboration with doctors for administering tocolytic therapy so that pregnancy can be maintained. Partus Prematurus Iminens is a threat in pregnancy where labor will occur at the age of pregnancy that has not been term (20 to 37 weeks) or birth weight less than 2500 grams. Pregnant women are expected to be aware of the danger signs in advanced pregnancy and when consultation with health services is found immediately.*

**Keywords:** *Pregnancy, Partus Prematurus Imminens*

**Information :**

- 1. Student of Midwifery**
- 2. Supervisors**