

**ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL NY “N” G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>A<sub>0</sub> TRIMESTER  
II DENGAN KEHAMILAN RESIKO TINGGI DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS BANGUN JAYA DESA BANDUNG  
MARGA REJANG LEBONG  
TAHUN 2019**



**OLEH :**

**ERIYANTI  
NPM: 18240041P**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D III) RPL FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN (FIKES)  
UNIVERSITAS DEHASEN  
BENGKULU  
2019**

## ABSTRAK

### **ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL NY “N” G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>A<sub>0</sub> TRIMESTER II DENGAN KEHAMILAN RESIKO TINGGI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANGUN JAYA DESA BANDANG MARGA REJANG LEBONG 2019**

Oleh :

**Eriyanti <sup>1)</sup>**

**Ronalen Br. Situmorang <sup>2)</sup>**

**Indra Iswari <sup>2)</sup>**

Usia remaja adalah antara 10-18 tahun, tetapi berdasarkan penggolongan umur, masa remaja terbagi menjadi 3 yaitu masa remaja awal (10-13 tahun), masa remaja tengah (11-16 tahun), masa remaja akhir (17-19 tahun). Pada ibu hamil dengan kehamilan resiko tinggi usia remaja menyebabkan alasan bagi penulis untuk mengangkat masalah ini dalam laporan kasus.

Laporan kasus ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara langsung pada ibu hamil trimester II dengan kehamilan resiko tinggi melalui pendekatan proses asuhan kebidanan secara komprehensif.

Dalam penyusunan laporan kasus ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan data-data yang di dapat. Dari pengkajian yang dilakukan ditemui diagnosa yaitu ibu hamil dengan kehamilan resiko tinggi usia remaja dapat berpotensi terjadi persalinan bayi premature. Tindakan segera dapat di lakukan dalam tindakan pada pasien adalah memberikan pendidikan kesehatan, penyuluhan, pengarahan pada ibu hamil selama masa kehamilannya agar tidak menimbulkan bentuk kelainan patologis selama kehamilan. Hal ini perlu dilakukan karena jika tidak dilakukan tindakan secara cepat dapat menjadi suatu masalah pada kesehatan ibu hamil dan janinnya. Kehamilan dengan resiko tinggi dapat dicegah apabila gejalanya di temukan sedini mungkin sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan secara dini. Sebagian besar kematian ibu hamil dapat dicegah apabila mendapatkan penanganan yang adekuat difasilitas kesehatan.

Untuk ibu hamil dengan kehamilan trimester II dengan kehamilan resiko tinggi usia remaja diharapkan lebih memperhatikan kesehatan dan asupan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal, mengenali tanda bahaya kehamilan, melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur se lalu mendekati diri kepada Tuhan untuk beribadah.

Kata Kunci : *Asuhan Kebidanan, Remaja Putri, Kehamilan Trimester II*

Keterangan :

1. Calon Ahli Madya Kebidanan
2. Pembimbing

## **ABSTRACT**

### **MIDWIFERY CARE FOR PREGNANCY MOTHER MRS “N” GIP0A0 DURING TRISEMESTER II WITH HIGH RISK PREGNANCY IN THE WORKING AREA OF BANGUN JAYA PUBLIC HEALTH CENTER BANDANG MARGA VILLAGE IN REJANG LEBONG 2019**

By:

Eriyanti <sup>1)</sup>

Ronalen Br. Situmorang <sup>2)</sup>

Indra Iswari <sup>2)</sup>

*Teenage age is between 10-18 years, but based on age classification, adolescence is divided into 3 namely early adolescence (10-13 years), middle adolescence (11-16 years), and late adolescence (17-19 years). In pregnant women with high risk pregnancies in adolescence cause reasons for the authors to raise this issue in case reports. This case report aims to gain direct knowledge and understanding of second trimester pregnant women with high risk pregnancies through a comprehensive approach to midwifery care. In compiling this case report using a descriptive method that is by disclosing facts in accordance with the data obtained. From the assessment, a diagnosis was found that pregnant women with high-risk pregnancies in adolescence can potentially lead to premature delivery. Immediate action can be done in action on patients is to provide health education, counseling, direction to pregnant women during pregnancy so as not to cause forms of pathological abnormalities during pregnancy. This needs to be done because if no action is taken quickly it can become a problem for the health of the pregnant woman and her fetus. A high risk pregnancy can be prevented if symptoms are discovered as early as possible so that preventive measures can be taken early. Most maternal deaths can be prevented if they receive adequate treatment in a health facility. For pregnant women with second trimester pregnancies with high risk pregnancies, teenagers are expected to pay more attention to health and nutritional intake for optimal growth and development, recognize danger signs of pregnancy, carry out regular pregnancy checks always draw closer to God for worship.*

*Keywords: Midwifery Care, Female teenager, pregnancy during trisemester II*

*Information:*

*1) Students*

*2) Supervisors*