

**ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL DENGAN RESIKO TINGGI  
JARAK KEHAMILAN KURANG DARI DUA TAHUN  
DI PUSKESMAS PASAR IKAN  
TAHUN 2019  
LAPORAN TUGAS AKHIR**



Oleh:

**LESTARI SANGRILA**  
**NPM :1624260031 DB**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIII)  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
TAHUN 2019**

## **ABSTRAK**

### **ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL DENGAN RESIKO TINGGI JARAK KEHAMILAN KURANG DARI DUA TAHUN DI PUSKESMAS PASAR IKAN TAHUN 2019**

**Oleh :**  
**Lestari Sangrila<sup>1)</sup>**  
**Ida Samidah<sup>2)</sup>**  
**Indra Iswari<sup>2)</sup>**

*World Health Organization (WHO) mengemukakan bahwa kematian ibu merupakan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Kematian ibu selama masa hamil, persalinan dan nifas merupakan salah satu aspek yang memberikan kontribusi dalam perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan sektor kesehatan, juga menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, ibu bersalin dan pada masa nifas. Angka kematian ibu lebih dari 289.000 (WHO, 2016). WHO pada tahun 2015 mengemukakan bahwa tercatat Angka Kematian Ibu (AKI) dalam kehamilan dan persalinan di dunia mencapai 102/100.000 kelahiran hidup (Sanra Maria Corneles dan Fredrika N.Losu, 2017) Laporan akhir ini bertujuan Untuk menerapkan Manajemen Asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi jarak kehamilan kurang dari dua tahun .*

Dalam studi kasus ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian case study research.Teknik sampling penelitian menggunakan non probability sampling dengan pendekatan *purposive sampling*. Dimana dalam hasil penelitian nanti akan di dokumentasikan dalam bentuk VARNEY.

Berdasarkan masalah yang peneliti temukan Ibu merasa merasa cemas, gangguan rasa nyaman, resiko infeksi.Ibu kurang mendapat informasi tentang resiko tinggi dalam kehamilan Selama melakukan pengkajian terhadap pasien. Didapatkan hasil pengkajian semua data yang ada diteoritis hampir sama dengan yang ada pada kasus.

Diharapkan bagi tenaga kesehatan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya mengenai penatalaksanaan asuhan kebidanan pada ibu dengan resiko tinggi jarak kehamilan kurang dari dua tahun.

**Kata kunci : Ibu Hamil, Resiko tinggi jarak kehamilan kurang dari dua tahun**

**Keterangan :**

1. Calon Ahli Madya Kebidanan
2. Pembimbing

## **ABSTRACT**

### **A MIDWIFERY CARE FOR PREGNANT WOMEN WITH HIGH RISK OF PREGNANCY INTERVAL LESS THAN TWO YEARS AT PASAR IKAN PUBLIC HEALTH CENTER IN 2019**

**By:**

**Lestari Sangrila<sup>1)</sup>**

**Ida Samidah<sup>2)</sup>**

**Indra Iswari<sup>2)</sup>**

*The World Health Organization (WHO) states that maternal deaths are deaths that occur in mothers due to pregnancy, childbirth, and the puerperium. Maternal mortality during pregnancy, childbirth and puerperal is one aspect that contributes to the calculation of the Maternal Mortality Rate (MMR) and is a key indicator of the success of health sector development, and also illustrates the level of health office especially for pregnant women, maternity mothers and during the postpartum period. The maternal mortality rate is more than 289,000 (WHO, 2016). WHO in 2015 stated that the recorded maternal mortality rate (MMR) in pregnancy and childbirth in the world reached 102 / 100,000 live births (Sanra Maria Corneles and Fredrika N.Losu, 2017). This final report aims to implement midwifery care management for pregnant women with high risk of pregnancy interval less than two years.*

*In this case study the researcher used a qualitative approach with a case study research strategy. Research sampling technique uses non probability sampling with a purposive sampling approach. Whereas, the result of this study will be documented in VARNEY.*

*Based on the problem that researchers found, mothers felt anxious about their pregnancy anemia / hypertension / preeclampsia, the risk of Ante Pertum and Post Partum Bleeding, discomfort, the risk of infection. Mothers lack information about the high risk of pregnancy.*

*During the assessment of patients. Obtained the results of the study of all data in theoretical almost the same as in the case.*

*It is hoped that health workers will be able to enrich knowledge and increase insight, especially regarding the management of midwifery care for mothers with a high risk of pregnancy interval of less than two years.*

**Keywords : Pregnant Women, High risk of pregnancy interval of less than two years.**

**Information :**

1. Student

2. Supervisors

