

**ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER III NY "J" UMUR
31 TAHUN G4P3A0 DENGAN PEROKOK PASIF DI BPM "R" WILAYAH
KERJA
PUSKESMAS KANDANG
KOTA BENGKULU
TAHUN 2019**

LAPORAN TUGAS AKHIR



OLEH:

**MARDALENA
NPM 1624260034 DB**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIII)
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
TAHUN 2019**

ABSTRAK

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER III NY “J” UMUR 31 TAHUN G4P3A0 DENGAN PEROKOK PASIF DI BPM “R” WILAYAH KERJA PUSKESMAS KANDANG KOTA BENGKULU TAHUN 2019

Oleh

Mardalena¹

Diyah Tepi²

Tita Septi Handayani²

Sebanyak 18 juta kematian didunia akibat serangan jantung dipicu oleh kebiasaan merokok dan 890 ribu orang yang meninggal dunia dikarenakan posisi mereka sebagai perokok pasif. Propinsi Bengkulu memiliki kunjungan Ibu hamil sebanyak 41.173 tahun 2017 dimana ibu hamil tersebut berpotensi menjadi perokok pasif. Dampak yang dapat terjadi pada ibu hamil dengan perokok pasif diantaranya abortus, kecacatan janin, dan BBLR. Maka, penting sekali dilakukan asuhan pada ibu hamil dengan perokok pasif agar terhindar dari gangguan kesehatan ibu maupun janin. Laporan kasus ini adalah untuk melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan perokok pasif di BPM “R” kota Bengkulu Tahun 2019 sesuai teori manajemen kebidanan yang diaplikasikan dalam asuhan kebidanan.

Dalam penyusunan laporan kasus ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan data-data yang didapat. Hasil Asuhan Kebidanan pada Ny “J” Umur 31 tahun dengan perokok pasif didapat hasil keadaan umum ibu baik, kesadaran compos mentis, TTV dalam batas normal dan ibu berhasil terhindar dari asap rokok.

Kesimpulan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah asap rokok sangat membahayakan kesehatan ibu hamil, maka disarankan pada ibu untuk menjauhi paparan asap rokok.

Kata Kunci : Ibu Hamil, Perokok Pasif

Keterangan: 1. Calon Ahli Madya Kebidanan

2. Pembimbing

ABSTRACT

MIDWIFERY CARE AT TRIMESTER PREGNANT WOMEN III NY "J" AGE 31 YEARS G4P3A0 WITH SMOKERS PASSIVE IN "R" BPM WORK AREA PUSKESMAS KANDANG BENGKULU CITY IN 2019

By :

Mardalena¹⁾

**Diyah Tepi²⁾
Tita Septi Handayani²⁾**

As many as 18 million deaths worldwide due to heart attacks are triggered by smoking and 890 thousand people die due to their position as passive smokers. Bengkulu Province has 41,173 pregnant women visiting in 2017 where pregnant women have the potential to become passive smokers. Impacts that can occur in pregnant women with passive smoking include abortion, fetal disability, and LBW. So, it is very important to care for pregnant women with passive smokers to avoid maternal and fetal health problems. This case report is to conduct midwifery care for pregnant mothers with passive smokers in the BPM "R" Bengkulu city in 2019 according to the theory of midwifery management applied in midwifery care. In compiling this case report using a descriptive method that is by disclosing facts in accordance with the data obtained.

Results of Midwifery Care in Mrs. "J" Age 31 years with passive smokers obtained a good mother's general condition, compos mentis awareness, TTV in normal limits and the mother managed to avoid cigarette smoke.

The conclusion of this Final Project report is that cigarette smoke is very dangerous for the health of pregnant women, so it is recommended for mothers to stay away from exposure to cigarette smoke.

Keywords : Pregnant Women, Passive Smokers

Information : 1. Prospective Midwifery Expert

2. Supervisor