

**ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI “ M ” UMUR 40 HARI DENGAN  
DIAPER RASH DI BPM “M” WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS JEMBATAN KECIL KOTA BENGKULU**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**



**OLEH:**

**RECI PUTRI UTAMI**  
**NPM.1624260048 DB**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D III)  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
TAHUN 2019**

**ABSTRAK**

**ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI “M” UMUR 40 HARI DENGAN  
DIAPER RASH DI BPM “M”WILAYAH KERJA PUSKESMAS JEMBATAN  
KECIL KOTA BENGKULU**

**Oleh :**

**Reci Putri Utami<sup>1)</sup>**

**Dr. Ida Samidah<sup>2)</sup>**

**Ronalen Situmorang<sup>2)</sup>**

*Diaper rash* merupakan salah satu kelainan peradangan kulit berupa iritasi dan inflamasi di daerah yang tertutup popok, yaitu lipatan paha, perut bawah, pantat, dan anogenital yang banyak ditemukan pada bayi dan batita yang menggunakan popok. Laporan kasus ini adalah untuk dapat melaksanakan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam penanganan Asuhan Kebidanan pada Bayi “M” Umur 40 Hari dengan *Diaper rash* di BPM Maryani, SST, SKM Kota Bengkulu Tahun 2019. Dalam penyusunan laporan kasus ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan data yg didapat. Dari pengkajian yang dilakukan ditemukan duadiagnosa yaitu bintik-bintik merah pada kulit daerah bokong berhubungan dengan kurangnya memperhatikan kebersihan kesehatan bayi. Penanganan bayi *diaper rash* yaitu beritahu ibu tidak memakaikan bayinya popok disposable (pampers).

*Diaper Rash* merupakan salah satu masalah medis yang umum terjadi pada bayi dikarenakan berbagai faktor. Ibu yang kurang memperhatikan kebersihan kesehatan bayinya khususnya daerah bokong. Kondisi kulit bayi yang relatif lebih tipis menyebabkan bayi lebih rentan terhadap infeksi, iritasi, dan alergi. Untuk ibu diharapkan lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan bayinya.

Kata Kunci: Bayi, *Diaper Rash*

Keterangan :1. Calon Ahli Madya Kebidanan

2. Pembimbing

## **ABSTRACT**

### **A MIDWIFERY CARE FOR BABY "M" AGED 40 DAYS WITH DIAPER RASH AT BPM "M" IN THE WORKING AREA OF JEMBATAN KECIL PUBLIC HEALTH CENTER IN BENGKULU CITY**

**By:**

**Reci Putri Utami<sup>1)</sup>**

**Dr. Ida Samidah<sup>2)</sup>**

**Ronalen Situmorang<sup>2)</sup>**

Diaper rash is one of the inflammatory disorders of the skin in the form of irritation and inflammation in the diaper-covered area, namely the folds of the thighs, lower abdomen, buttocks, and anogenital which are commonly found in infants and toddlers who use diapers.

This case report is to be able to implement and improve the ability of the author in handling Midwifery Care in baby "M" aged 40 Days with Diaper Rash at BPM Maryani, SST, SKM in Bengkulu City in 2019.

This case report used a descriptive method that is by disclosing facts in accordance with the data obtained.

From the study conducted found a diagnosis namely red spots on the skin of the buttocks area associated with lack of attention to the health of the baby's health. Handling of diaper rash babies is to tell the mother not to wear baby disposable diapers (pampers).

Diaper Rash is one of the common medical problems that occur in infants due to various factors. Mothers who pay less attention to the cleanliness of their baby's health, especially the buttocks area. The baby's relatively thin skin condition makes the baby more susceptible to infections, irritations, and allergies. Mothers are expected to pay more attention to the cleanliness and health of their babies.

**Keywords:** Baby, Diaper Rash

**Description:** 1. Student

2. Supervisors