

**ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMI DENGAN POSTTERM DI
RUANG RAWAT INAP MAWAR RSUD DR M YUNUS BENGKULU
TAHUN 2019**

LAPORAN TUGAS AKHIR



OLEH :

RIEKE SISKA RIKA SAFITRI
NPM : 1624260054 DB

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIII) FAKULTAS ILMU KESEHATAN
(FIKES) UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU TAHUN 2019**

ABSTRAK

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL DENGAN POSTTERM DI RUANG RAWAT INAP MAWAR RSUD DR.M.YUNUS KOTA BENGKULU TAHUN 2019

Oleh:

Rieke Siska Rika Safitri ¹⁾

Syami Yulianti ²⁾

Ekasari Yussiartin Panji ²⁾

Menurut *World Health Organization* (WHO) Angka Kematian Ibu masih sangat tinggi sekitar 830 wanita meninggal karena kehamilan atau persalinan di seluruh dunia setiap hari. Pada tahun 2015, sekitar 303.000 wanita meninggal selama dan setelah kehamilan dan persalinan. Di Indonesia angka kejadian kehamilan lewat

waktu kira-kira 10%, bervariasi antara 10,4 – 12 % apabila diambil batas waktu 42 minggu dan 3,4 – 4 % apabila diambil batas waktu 43 minggu.

Laporan akhir ini dibuat untuk melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil usia kehamilan 40-41 minggu dengan postterm di ruang rawat inap mawar RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu dengan manajemen kebidanan menurut varney.

Dalam penyusunan laporan studi kasus ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan data-data yang didapatkan.

Dari pengkajian yang di dapatkan hasil ibu hamil usia kehamilan 40-41 minggu dengan keluhan kehamilannya sudah lewat bulan, gerakan janin berkurang, belum ada kontraksi. Asuhan yang diberikan berupa anjuran untuk persalinan induksi berkolaborasi dengan dokter serta observasi denyut jantung janin. Hasil evaluasi dari asuhan yang diberikan pada ibu melakukan persalinan induksi.

Kehamilan serotinus atau kehamilan lewat waktu adalah kehamilan yang telah berlangsung selama 42 minggu (294 hari) atau lebih, pada siklus haid teratur rata-rata 28 hari dan haid pertama dan terakhir diketahui dengan pasti. Diagnose usia kehamilan lebih dari 42 minggu didapatkan dari perhitungan rumus neagle atau dengan tinggi fundus uteri serial.

Kata kunci : *Postterm*, Ibu Hamil

Keterangan : 1. Calon Ahli Madya

2. Pembimbing

ABSTRACT

A MIDWIFERY CARE FOR PREGNANT WOMEN WITH POSTTERM IN MAWAR INPATIENT ROOM OF DR. M. YUNUS REGIONAL GENERAL HOSPITAL OF BENGKULU CITY IN 2019

By:

Rieke Siska Rika Safitri¹⁾

Syami Yulianti²⁾

Ekasari Yussiartin Panji, SST²⁾

According to the World Health Organization (WHO) Maternal Mortality Rate is still very high around 830 women die from pregnancy or childbirth around the world every day. In 2015, around 303,000 women died during and after pregnancy and childbirth. In Indonesia the incidence of pregnancy which is over the limit is 10%, varying between 10.4 - 12% if the 42 weeks deadline is taken and 3.4 - 4% if the 43 weeks deadline is taken. This final report was made to perform a midwifery care for pregnant women 40-41 weeks gestational age with postterm in Mawar inpatient room of Dr.M.Yunus Bengkulu Regional General Hospital with obstetric management according to Varney. This case study report uses a qualitative descriptive method, namely by disclosing facts in accordance with the data obtained. From the assessment obtained results of pregnant women 40-41 weeks of gestation with complaints of pregnancy are past the month, fetal movement is reduced, there is no contraction. Care provided in the form of suggestions for induction labor in collaboration with doctors and observation of fetal heart rate. Evaluation results of care given to mothers undergoing induction labor. Serotinous pregnancy or overdue pregnancy is a pregnancy that has lasted 42 weeks (294 days) or more, on a regular menstrual cycle of an average of 28 days and the first and last menstruation is known with certainty. Diagnosis of gestational age of more than 42 weeks is obtained from the calculation of the Neagle formula or with serial fundus uteri height.

Keywords: Postterm, Pregnant Women

Information :

- 1. Student**
- 2. Supervisors**