

**ASUHAN KEBIDANAN PADA NY H UMUR 30 TAHUN AKSEPTOR KB  
IUD DENGAN EROSI PORTIO DI  
PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG  
KOTA BENGKULU**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**



**OLEH:**

**YULI MULIANA  
NPM. 1624260080 DB**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D III)  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
TAHUN 2019**

## **ABSTRAK**

### **ASUHAN KEBIDANAN PADA NY H UMUR 30 TAHUN AKSEPTOR KB IUD DENGAN EROSI PORTIO DI PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU**

**Oleh:**  
**Yuli Muliana<sup>1)</sup>**  
**Jumita<sup>2)</sup>**  
**Tita Septi Handayani<sup>2)</sup>**

Di Indonesia, penggunaan MKJP masih tergolong rendah. Pada tahun 2017, dari 23.606.218 peserta KB aktif, terhitung hanya 4.118.936 (17,45%) akseptor KB MKJP dengan jumlah pengguna KB IUD sebanyak 1.688.685 (7,15%).

Laporan kasus ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara langsung pada klien dengan erosi portio melalui pendekatan asuhan kebidanan secara kompresnsif.

Dalam penyusunan laporan kasus ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan data-data yang didapat.

Dari hasil pengkajian yang dilakukan, ditemukan permasalahan akseptor KB IUD dengan erosi portio dengan nyeri dan keputihan sehingga menimbulkan rasa cemas dan rasa tidak nyaman. Apabila kasus erosi portio tidak segera ditangani akan menimbulkan resiko infeksi.

Akseptor KB IUD dengan erosi portio dapat timbul karena berbagai faktor, maka diharapkan bagi petugas kesehatan dalam pemasangan KB IUD hendaknya dilakukan sesuai dengan standar dan klien juga kontrol ulang secara teratur ke pelayanan kesehatan.

Kata kunci : Erosi portio, akseptor KB IUD

Keterangan:

1. Calon Ahli Madyaa
2. Pembimbing

## **ABSTRACT**

### **A MIDWIFERY CARE FOR MRS. H AGED 30 YEARS IUD ACCEPTORS WITH PORTIO EROSION AT RATU AGUNG PUBLIC HEALTH CENTER OF BENGKULU CITY**

By:  
**Yuli Muliana<sup>1)</sup>**  
**Jumita<sup>2)</sup>**  
**Tita Septi Handayani<sup>2)</sup>**

*In Indonesia, the use of the Long-Term contraception method is still relatively low. In 2017, out of 23,606,218 active family planning participants, only 4,118,936 (17.45%) the Long-Term contraception method acceptors were registered with 1,688,685 KB users (7.15%). This case report is to acquire direct knowledge and understanding of the client with portio erosion through a compressive midwifery approach. In compiling this case report used the case study method by revealing the facts in accordance with the data obtained. From the results of the study, IUD contraception acceptors found problems with portio erosion with pain and vaginal discharge, causing anxiety and discomfort. If the portio erosion case is not treated immediately it will cause an infection risk. IUD contraception acceptors with portio erosion can arise due to various factors, it is expected that health workers in the installation of IUD birth control should be done in accordance with the standards and the client also regularly re-control health services.*

*Keywords: Portio Erosion, IUD Contraception Acceptor.*

*Information:*

- 1. Student*
- 2. Supervisors*