

**ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. “M” UMUR 36 TAHUN P5
A0 DENGAN RUPTUR PERINEUM MENGGUNAKAN CEBOK
AIR REBUSAN DAUN SIRIH DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN
FITRI ANDRI, STr.KeB, SKM KOTA BENGKULU TAHUN
2020**

LAPORAN TUGAS AKHIR



Oleh :
PUTRI ARI YANI
NPM : 1724260038DB

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIII)
FAKULTAS ILMU KESEHATAN(FIKES)
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
TAHUN 2020**

ABSTRAK

ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. “M” UMUR 36 TAHUN P5 A0 DENGAN RUPTUR PERINEUM MENGGUNAKAN CEBOK AIR REBUSAN DAUN SIRIH DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN FITRI ANDRI, STr.KeB, SKM KOTA BENGKULU TAHUN 2020

Oleh :

Putri Ari Yani ¹⁾

Jumita ²⁾

Ravika Ramlis ²⁾

Banyaknya angka kejadian ibu bersalin mengalami ruptur perineum yaitu di amerika dari 26 juta ibu bersalin terdapat 40% ruptur perenium, di asia 50% dari kejadian robekan perineum, di indonesia robekan perineum pada golongan umur 25-30 tahun 24% dan umur 32-39 tahun 62% pada tahun 2011 menyebabkan alasan penulis untuk mengangkat masalah ini dalam laporan kasus. Laporan kasus ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara langsung pada klien dengan Ruptur Perineum melalui pendekatan proses asuhan kebidanan secara komprehensif. Dalam penyusunan kasus ini menggunakan deskriptif yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan data-data yang didapat. Dari pengkajian yang dilakukan ditemukan diagnosa yaitu ibu mengatakan saat ini terasa nyeri ada luka jahitan. Setelah dilakukan asuhan dengan menggunakan cebok air rebusan daun sirih selama lima hari luka jahitan ruptur perineum sudah kering. Untuk ibu nifas ruptur perineum diharapkan untuk sering melakukan personal hygiene menggunakan cebok air rebusan daun sirih setiap kali habis BAB dan BAK.

Kata Kunci : Ruptur Perineum

Keterang :

1:Calon Ahli Madya Kebidanan

2:Pembimbing

ABSTRACT

***A MIDWIFERY CARE FOR MRS. "M" AGED 36 YEARS P5 A0
WITH PERINEAL RUPTURE USING BOILED BETEL LEAVES
FOR WIPING IN INDEPENDENT MIDWIFE PRACTICE OF
FITRI ANDRI LESTARI, STR.KEB, SKM
IN BENGKULU CITY IN 2020***

By :
Putri Ari Yani ¹⁾
Jumita ²⁾
Ravika Ramlis ²⁾

The number of incidence of maternal perineal rupture, namely in America of 26 million women giving birth there are 40% perenium rupture, in Asia 50% of the incidence of perineal tear, in Indonesia perineal tear is in the age group of 25-30 years 24% and age 32- 39 years 62% in 2011 gave the author reasons to raise this issue in the case reports. This case report is to gain knowledge and understanding directly from clients with perineal rupture through a comprehensive midwifery care process approach. In the preparation of this case using descriptive, namely by disclosing facts in accordance with the data obtained. From the study conducted, it was found that the mother said that at this time there was pain with stitches. After the care by using boiled water of betel leaf for five days, the perineal rupture suture wound is dry. For postpartum mothers, perineal rupture is expected to often carry out personal hygiene using boiled betel leaf water every time after defecating and bladder.

Keywords: Perineal Rupture:

1: Student

2: Supervisors