


**ASUHAN KEPERAWATAN PADA BAYI NY."N" DENGAN
BERAT BADAN LAHIR RENDAH DI RUANG PERINA
RUMAH SAKIT HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU
TAHUN 2021**

KARYA TULIS ILMIAH



OLEH :

RAHMATUL USRA
NPM : 18250031

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN (DIII) FAKULTAS ILMU
KESEHATAN (FIKES) UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
TAHUN 2021**

ABSTRAK

ASUHAN KEPERAWATAN PADA BAYI NY."N" DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH DI RUANG PERINA RUMAH SAKIT HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU TAHUN 2021

Oleh :

Rahmatul Usra ¹⁾

Murwati ²⁾

Handi Rustandi ²⁾

Berdasarkan data awal di Rumah Sakit Harapan Dan Do'a Kota Bengkulu di dapatkanbanyaknya angka kejadian BBLR pada bayi baru lahir yaitu 93 bayi pada tahun 2018,47 bayi pada tahun 2019 dan 18 bayi pada tahun 2020. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) merupakan penyebab dasar kematian (underlying cause) dari dua pertiga kematian neonatus.Sebagian besar angka kematian anak di Indonesia saat ini terjadi pada masa neonatal atau pada bulan pertama kehidupan yaitu sebesar 19 per 1000 kelahiran hidup. Menyebabkan alasan bagi penulis untuk mengangkat masalah ini dalam laporan kasus. Tujuan laporan studi kasus ini adalah untuk melaksanakan pengkajian,menentukan diagnose,menyusun rencana,melakukan tindakan keperawatan,melaksanakan evaluasi akhir,mampu membandingkan dan menganalisa kesenjangan antara teori dan kasus serta mampu melaksanakan dokumentasi. penyusunan laporan kasus ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode studi kasus pemberian asuhan keperawatan yang dilakukan pengkajian langsung kepada Bayi Ny."N" di Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu. hasil pengkajian yang di lakukan mulai tanggal 5 Juli – 10 Juli 2021 ditemukan tiga diagnose yang muncul yaitu : pola nafas tidak efektif,hipotermi,dan defisit nutrisi. Dan semua diagnose yang di tegakkan di hentikan selama perawatan 6 hari dengan kriteria hasil Pola nafas tidak efektif teratas,hipotermi teratas dan defisit nutrisi teratas. Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang asuhan keperawatan pada bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di ruang perinatology Rumah Sakit Harapan dan Do'a Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa organ tubuh yang belum normal terutama pada organ pencernaan, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada berat badan bayi.Disarankan kepada pihak Rumah Sakit Harapan dan Do'a Kota Bengkulu untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi orang tua dan keluarga pasien yang mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang dirawat di Rumah Sakit Harapan dan Do'a Kota Bengkulu untuk menerapkan pemberian asi pada bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan reflek hisap yang masih lemah agar mengalami kenaikan berat badan sesuai dengan usianya.

Kata kunci : Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Keperawatan Maternitas, Asuhan Keperawatan

Keterangan :

1. Calon Ahli Madya Keperawatan
2. Pembimbing

ABSTRACT

A NURSING CARE FOR MRS. N'S BABY WITH LOW BIRTH WEIGHT IN PERINA ROOM OF HARAPAN DAN DOA HOSPITAL BENGKULU CITY IN 2021

By :
Rahmatul Usra ¹⁾
Murwati ²⁾
Handi Rustandi ²⁾

Based on preliminary data in Harapan dan Do'a Hospital in Bengkulu City, it is found that the number of LBW cases in newborns was 93 babies in 2018, 47 babies in 2019 and 18 babies in 2020. Low Birth Weight (LBW) is underlying cause of death of two-thirds of neonatal deaths. Most of the children mortality rate in Indonesia currently occurs in the neonatal period or in the first month of life, which is 19 per 1000 live births. Causing reason for the researcher to raise this issue in the case report. The purpose of this study is to carry out assessments, determine diagnoses, develop plans, nursing actions, final evaluations, be able to compare and analyze gaps between theories and cases and be able to carry out documentation. The preparation of this study used a descriptive method, which is a case study method of providing nursing care which is carried out by direct assessment of Mrs. N's baby in Harapan dan Doa Hospital, Bengkulu City. The results of the assessment carried out from 5 to 10 July, 2021 found three diagnoses that emerged, namely: ineffective breathing patterns, hypothermia, and nutritional deficits. And all diagnoses that were established were stopped during the 6-day treatment with the result criteria that the ineffective breathing pattern was resolved, hypothermia was resolved and the nutritional deficit was resolved. The results of research that has been carried out on nursing care for infants with low birth weight (LBW) in the perinatology room of Harapan dan Doa Hospital, Bengkulu City can be concluded that the organs of the body are not yet normal, especially in the digestive organs, so that it can have an impact on body weight. It is recommended to Harapan dan Doa Hospital, Bengkulu City to provide information and knowledge for parents and families of patients with low birth weight (LBW) who are being treated in Harapan dan Doa Hospital, Bengkulu City to apply the provision of breastfeeding in infants with low birth weight (LBW) with weak suction reflexes in order to gain weight according to their age.

Keywords: *Low Birth Weight (LBW), Maternity Nursing, Nursing Care*

Information:

1. Student
2. Supervisors