

**ASUHAN KEBIDANAN PADA Ny. H UMUR 35 TAHUN G3P2A0H2
DENGAN PERSALINAN NORMAL KALA I FASE AKTIF DI BPM SITI
HOLIJAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2018**

STUDI KASUS



Oleh :
AGUSTINA PYSERIANA
(NPM : 172426001 DBRPL)

**Diajukan Kepada Universitas Dehasen Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Kebidanan (DIII)**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIII) RPL FAKULTAS ILMU
KESEHATAN (FIKES)
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
TAHUN 2018**

ABSTRAK

ASUHAN KEBIDANAN PADA Ny. H UMUR 35 TAHUN G3P2A0H2 DENGAN PERSALINAN NORMAL KALA I FASE AKTIF DI BPM SITI HOLIJAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018

Agustina Pyseriana. 2018. *Asuhan Kebidanan Pada Ny. H Umur 35 Tahun G3P2A0H2 dengan Persalinan Normal Kala I Fase Aktif di BPM Siti Holijah Kota Bengkulu Tahun 2018*. Program Studi Kebidanan (DIII) RPL. Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Dehasen Bengkulu. Pembimbing 1: Syami Yulianti, SST., M.Keb. Pembimbing II : Ns. Berlian Kando S, S.Kep., M.Kes.

Kala I persalinan dapat menimbulkan respon psikologis dan fisik sehingga ibu akan mengalami kecemasan dan nyeri. Nyeri persalinan merupakan pengalaman subjektif tentang sensasi fisik yang terkait dengan kontraksi uterus, dilatasi dan penipisan serviks, serta penurunan janin selama persalinan. Pada primigravida perasaan khawatir dengan nyeri dirasakan dengan lamanya proses persalinan dan ketakutan yang terjadi pada bayinya, pada multigravida perasaan diganggu oleh rasa takut, tegang dan cemas oleh bayangan sakit pada pengalaman persalinan terdahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah mampu melakukan asuhan kebidanan pada Ny. H Umur 35 Tahun G3P2A0H2 dengan Persalinan Normal Kala I Fase Aktif di BPM Siti Holijah Kota Bengkulu Tahun 2018 dengan manajemen varney. Desain penelitian menggunakan metode deskriptif studi kasus. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling* dengan subjek 1 orang ibu inpartu kala I di BPM Siti Holijah Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan gejala persalinan biasanya disertai dengan rasa gelisah menahan rasa sakit, cemas dan takut dalam menghadapi persalinan. Penatalaksanaan pada kala I fase aktif persalinan normal meliputi observasi setiap 4 jam keadaan umum, tanda-tanda vital, pembukaan serviks, dan penurunan kepala, serta observasi setiap ½ jam kontraksi uterus, DJJ dan cairan ketuban, anjurkan ibu berjalan-jalan, makan dan minum diantara his, relaksasi, dan teknik mengejan.

Kata kunci : Fase aktif, Kala I, Persalinan, Varney