


**ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU HAMIL DENGAN  
MOLAHIDATIDOSA DI RUANG MAWAR RSUD DR. M.  
YUNUS BENGKULU TAHUN 2019**

**KARYA TULIS ILMIAH**



**OLEH :**

**LINTRI  
NPM : 162426021 DP**

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN (DIII) FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN (FIKES) UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
TAHUN 2019**

## **ABSTRAK**

### **ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU HAMIL DENGAN MOLAHIDATIDOSA DI RUANG MAWAR RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU TAHUN 2019**

**Oleh :**  
Lintri <sup>1)</sup>  
Berlian Kando <sup>2)</sup>  
Murwati <sup>2)</sup>

Molahidatidosa dapat mengakibatkan perdarahan yang hebat sampai syok, perdarahan berulang-ulang yang dapat menyebabkan anemia, infeksi sekunder, perforasi karena keganasan kira-kira 18-20% kasus, akan menjadi mola destreens atau koriokarsinoma.

Laporan kasus ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara langsung pada ibu hamil dengan molahidatidosa di Ruang Mawar RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2019.

Dalam penyusunan laporan kasus ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan data yang didapat.

Dari pengkajian yang dilakukan ditemukan empat (4) diagnosa yaitu (1) Nyeri akut berhubungan dengan perdarahan dan proses perjalanan penyakit; (2) Kekurangan volume cairan berhubungan dengan perdarahan pervaginam; (3) Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, dan (4) Diagnosa tambahan yaitu: Ansietas berhubungan dengan pengeluaran ditandai dengan gelisah.

Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 hari hasil sesuai yang diharapkan peneliti yaitu klien tampak lebih tenang, nyeri berkurang, nafsu makan sedikit meningkat, pasien sudah dapat duduk dan berdiri, aktivitas mandiri. Diharapkan ibu selalu melakukan pemeriksaan kehamilan untuk mendeteksi dini kemungkinan bahaya kehamilan.

Kata kunci : Asuhan Keperawatan, Ibu Hamil, Molahidatidosa

Keterangan :

- 1: Calon Ahli Madya Keperawatan
- 2: Pembimbing

## **ABSTRACT**

### **A NURSING CARE FOR PREGNANT WOMEN WITH MOLAHIDATIDOSA IN MAWAR ROOM OF M. YUNUS REGIONAL GENERAL HOSPITAL OF BENGKULU IN 2019**

**By :**  
Lintri <sup>1)</sup>  
Berlian Kando <sup>2)</sup>  
Murwati <sup>2)</sup>

*Molahidatidosa can cause severe bleeding to shock, repeated bleeding that can cause anemia, secondary infections, perforation due to malignancy in approximately 18- 20% of cases, will be a mole destreuens or choriocarcinoma. This case report is to obtain knowledge and understanding directly on Molahidatidosa in Mawar Room of Dr. M. Yunus Regional General Hospital of Bengkulu in 2019. In compiling this case report, it used descriptive method namely by disclosing the facts in accordance with the data obtained. From the assessment conducted, it is found four (4) diagnoses, namely (1) acute pain associated with bleeding and the course of the disease; (2) Lack of fluid volume is related to vaginal bleeding; (3) Activity intolerance is related to weakness, and (4) Additional diagnoses are: Anxiety associated with expenditure is characterized by anxiety. After doing nursing care for 2 days the results expected are seen clearly that the client looks calmer, pain is reduced, appetite is slightly increased, the patient is able to sit and stand, also do independent activity.*

**Keywords:** Nursing Care, Pregnant Women, Molahidatidosa

**Information :**

1: Student

2: Supervisors